R

Observation Sur vn abcés au bas Ventre

14 mars. 1756.

Le 15 juillet 1743 Mlle le tellier veuve Du Sr. Minet agée De 47 ans, D'un temperament Sec et Sanguin, Me consulta Sur vne Douleur Sourde qui occupoit tout son coté Droit, et quon traitoit Depuis Vn an De douleurs De rhûmatisme, pendant lequel Elle avoit Eté obligé De garder le lit, Elle avoit Vne fievre lente, la jambe Du Même coté Etoit Extremmement racourcie.

je M'informay Exactement Des accidents qui avoient precedé cette Douleur, Elle Me dit quil y avoit Environ dix ans qu'Elle Etoit tombé Dans Sa cave De la hauteur De huit a dix Degrés Etant grosse De 4 Mois et Demy De son second Enfant, et que le coup avoit porté sur la region lombaire Droitte, ou elle avoit toujours sentis vne Douleur fixe Depuis ce temps, qui avoit augmenté Environ Vn an avant que je l'aye Vu, N'ayant Eté Saigné qu'une fois pour cette chûte, sans cependant quelle ait Eté suivie D'aucun accident pour ses couches qui furent fort heureuses; qu'outre cela Elle avoit toujours Eté bien reglé Depuis vingt et Vn ans, quelle avoit Eu quatre Enfants apres Sa chute, Dont Elle En avoit Nourrie Deux, quelle avoit Eté bonne Nourrice Sans jamais avoir Eté attaqué D'aucune Maladie.

Apres ces Eclaircissements je Voulûs M'assurer par l'etat De la region lombaire ou Etoit la douleur fixe, j'y reconnus vne pulsation profonde, et j'assuray a Mrs calvauts pere et fils Medecins

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 46 n° 35

Decette Ville, quil y avoit abcés dans cette partie, ils la convinrent, et j'en fis l'ouverture le lendemain 16. du même Mois en leur présence.

Je commençay par une incision perpendiculaire a quatre travers de doits des apophises transverses des vertebres des lombes, le long du corps du Muscle grand dorsal que j'ouvris de la longueur de quatre pouces, et auquel je fis une incision transversale au centre de l'incision, j'en tiray a peu prés quatre pintes d'un pus Verdatre et fort fœtide, j'introduisis alors Ma Main dans cette playe et je reconnus que le foyer des Matieres s'etoit formé entre le peritoine et les Muscles du bas Ventre.

Je fis Mettre la Malade dans une situation qui put faciliter l'écoulement des Matieres, Malgré cette precaution il se forma six jours apres une tumeur sans inflammation a la partie superieure de l'aine, que j'ouvris suivant son plis, et j'en tiray une pinte de pus un peu Moins fœtide.

Je fis pendant quelques jours une injection d'eau d'orge Miélé dans la playe superieure qui sortoit par l'inferieure ce qui Me fit abandonner la premiere.

Elles furent pansé tous les jours avec le baume verd de Taurry, j'entretins la derniere ouverte jusqua ceque les Matieres

furent Entierement taries, En trente cinq jours Elles furent cicatrisées.

Vn Mois apres Saguerison Elle se fit vne forte contusion* ala partie inferieure Ducoronal qui s'Etendoit lelong Des Sinus Surcilliers, je la saignay vne fois au bras, la fievre survint, Et le troisieme jour la premiere incision se rouvrit, il En Sortit quatre ou cinq onces D'un pus sereux, les bords Delaplaye Etoient flasques Et livides, je la dilatay Et Elle fut Encore pansée avec le Même baume Dont j'introduisis gros comme vne Noix Dans la playe, vn plumaceau, Et vne Emplastre D'onguent Dela Mere, En Dix jours Elle fut Entierement guerie sans rechutte Et Elle jouit Depuis cetemps D'une santé parfaitte, aiant Eté reglé jusqua L'age De 52 ans.

*contre vne cheminée

aarras ce 14 May 1756. Durand
Chirurgien
Major

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE